



ที่ ปน ๗๕๘๐๑/ว๐๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหา (COVID-๑๙)
และแนวการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙)

เรียน ได้ะอืหม่าม,สมาชิก อบต.บ้านกลาง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ,คณะกรรมการหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน , หัวหน้าชุดทักษิณสัมพันธ์ ที่ ๑๑๓

ตามหนังสือ ที่ ปน ๐๖๑๘/ว ๘๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและภาคเอกชน หลีกเลี่ยง หรือเลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล นั้น

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑.ขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัด มหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็น กิจกรรมที่ต้อง อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของ กิจกรรมอย่างรอบคอบ โดย คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณสุขโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคที่สำคัญ

๒.ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ในชุมชนอย่างใกล้ชิด หากพบ ประชาชนที่มีอาการไข้สูงอย่างรวดเร็ว ลดอยาก บวดยาระและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มี น้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที

๓.วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) ดังนี้

๓.๑ ดื่มน้ำอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก ๓๐ - ๕๐ ซีซี, ผู้ใหญ่ ๕๐ - ๘๐ ซีซี)

๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม

๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๓.๔ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

๓.๕ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ